TRAUMA

TRAUMA

Einsatzstelle Situation Sicherheit

- Persönliche Schutzausrüstung
- Gefahren an der Einsatzstelle
- Anzahl Verletzter / Betroffener
- Einwirkende Kräfte
- Verletzungsmechanismus

- Rückmeldung
- Nachforderung

Ersteinschätzung

- Gesamteindruck
- Bewusstseinslage / AVPU / Reanimationspflicht
- Unmittelbar lebensbedrohliche Verletzungen
- Radialispuls / Rekapillarisierungszeit
- Schnelle Inspektion von Kopf und Rumpf
- Hautfarbe / Temperatur

Patient potentiell kritisch?

< C / X

- Kritische äußere Blutung

Blutung stoppen:
1. manuelle Kompression
2. Druckverband
3. Tourniquet

SAMPLER -Anamnese

A – Airway
Atemweg

- Mögliche HWS-Verletzung
- Atemwege frei? / gefährdet? / verlegt?
- Inspektion des Mund- / Rachenraumes

- Freimachen der Atemwege
- Atemwegsmanagement
- HWS-Immobilisation
- angepasste Lagerung

B – Breathing
Atmung

- Ausreichende Belüftung
- Inspektion, Palpation, Auskultation*
- Atemfrequenz / Atemgeräusche
- SpO_2

- O_2-Gabe*
- ggf. Beatmung
- angepasste Lagerung

* Für SAP 2

C – Circulation
Kreislauf

- Kontrolle der peripheren, ggf. zentralen Pulse
- Rekapillarisierungszeit
- RR-Messung
- 4-Kanal-EKG
- Palpation von Abdomen, Becken und Oberschenkeln

- Schocksymptome:
  - IV-Zugang vorbeiten*
  - Volumengabe vorbereiten*
- Bedrohliche Blutung
- ggf. 12-Kanal-EKG*

* Für SAP 2

D – Disability
neurologische Defizite

- Beurteilung der Bewusstseinslage (AVPU / GCS)
- BZ-Messung*
- Pupillenkontrolle
- DMS-Kontrolle
- Inspektion, Palpation Kopf

- Reevaluation Bewusstsein
- angepasste Lagerung
- Immobilisation

* Für SAP 2

E – Exposure
Environment

- Entkleiden / äußere Einwirkungen
- Bodycheck
- Temperaturmessung

- Wärmeerhalt
- sterile Wundversorgung

Patient kritisch ?

suffiziente Basistherapie
▶ schnellstmöglicher Transport

INTERNISTISCH

INTERNISTISCH

Einsatzstelle Situation Sicherheit

- Persönliche Schutzausrüstung
- Gefahren an der Einsatzstelle

- Rückmeldung
- Nachforderung

Ersteinschätzung

- Gesamteindruck / Erstanamnese
- Bewusstseinslage / AVPU / Reanimationspflicht
- Radialispuls / Rekapillarisierungszeit
- Hautfarbe / Temperatur

Patient potentiell kritisch?

SAMPLER -Anamnese

A — Airway
Atemweg

- Atemwege frei? / gefährdet? / verlegt?
- Inspektion des Mund- / Rachenraumes

- Freimachen der Atemwege
- Atemwegsmanagement
- angepasste Lagerung

B — Breathing
Atmung

- Ausreichende Belüftung
- Inspektion, Palpation, Auskultation*
- Atemfrequenz / Atemgeräusche
- SpO_2

- O_2-Gabe*
- angepasste Lagerung
- ggf. Beatmung
- ggf. Kapnographie*

* Für SAP 2

C — Circulation
Kreislauf

- Kontrolle der peripheren, ggf. zentralen Pulse
- Rekapillarisierungszeit
- RR-Messung
- Palpation Abdomen
- 4-Kanal-EKG
- Venenfüllung / Halsvenenstauung

- ggf. IV-Zugang vorbereiten*
- angepasste Lagerung
- ggf. 12-Kanal-EKG*

* Für SAP 2

D — Disability
neurologische Defizite

- Beurteilung der Bewusstseinslage (AVPU / GCS)
- BZ-Messung*
- Pupillenkontrolle
- DMS-Kontrolle
- BEFAST

- angepasste Lagerung
- Verlaufskontrolle

* Für SAP 2

E — Exposure
Environment

- Entkleiden / äußere Einwirkungen
- Bodycheck
- Temperaturmessung

- Wärmeerhalt